

Tratamente pentru Afin

Nr. Crt.	Perioada aplicării	Boala sau dăunătorul	Denumirea comercială a produsului	Conc. %	Doza (g/ml per 10l apă)
1	Deschiderea mugurilor în frunzulițe (15–30 aprilie)	Cancerul tulpinii, arsura ramurilor, mumifierea fructelor, Antracnoza	Zeamă Bordeleză sau Cupru Calcic	0,5-1%	50-100g/10l apă
			Sulfomat 80	0,5%	50g/10l apă
			la două-trei zile se adaugă BioMIF		50-100g/10l apă
2	Înfrunzire (15–30 aprilie)	Cancerul tulpinii, arsura ramurilor, pătările frunzelor, dăunători	Polisulf	2%	200ml/10l apă
3	Înălțarea inflorescențelor (1–10 mai)	Antracnoză, septorioză, boli ale ramurilor, insecte defoliatoare, arsura și cancerul tulpinii	Polisulf	2%	200ml/10l apă
4	Scuturarea petalelor (15–30 mai)	Boli foliare și ale fructelor, insecte dăunătoare	Merpan 80 WDG	0,15-0,2%	15-20g/10l apă
			Sulfomat 80	0,4%	40g/10l apă
		la diferență de 5-7 zile	Mospilan	0,25%	25ml/10l apă
5	Legarea fructelor (început iunie)	Boli de rădăcină și frunze (aplicare prin irigare la nevoie)	Sulf Calcic	1%	100ml/10l apă
			sau Azosulfocalcica	2%	200ml/10l apă
6	Fructe verzi (mijloc de iunie)	Putregaiul cenușiu și boli foliare	Merpan 80 WDG	0,15-0,2%	15-20g/10l apă
			Sulfomat 80	0,3-0,4%	30-40g/10l apă
7	După recoltare (august–septembrie)	Antracnoză, septorioză, pătarea brună-violacee, insecte defoliatoare	Îmbăiere cu Polisulf pentru dezinfectia plantației	5%	500ml/10l apă
8	Noiembrie	Pregătire pentru repaos vegetativ	Cupru Calcic sau Zeamă Bordeleză	2-3%	200-300g/10l apă